

Donación de leche humana como acto de generosidad de las mujeres lactantes y principio de no discriminación positiva hacia los neonatos más vulnerables.

Josefa Aguayo-Maldonado, Elena Díaz-Salido, María José Rosas-Cervantes, María Beltrán-Moreno, Ana Isabel Garrido-Ocaña.*
Unidad de Gestión Clínica Neonatología. Banco de leche donada. H. Virgen Rocío. Sevilla.
** Estudiante de sexto de Medicina. Universidad de Sevilla*

Palabras claves: leche donada, neonatos, mujer donante.

Introducción

La misión de un banco de leche donada (BLD) es promocionar la donación de Leche materna (LM), para ofertarla a los recién nacidos (RN) con mayor vulnerabilidad, evitando morbi-mortalidad. El BLD se basa en tres pilares, las mujeres donantes, el procesamiento de LM y la indicación de los receptores. Los valores que lo sustentan son el altruismo, la generosidad, la equidad y la calidad.

Material y Métodos

Periodo estudio: 18 meses. Las variables estudiadas se obtienen de una base de datos anonimizada realizada para tal fin: número de donantes y su perfil, promedio de leche humana donada y las principales indicaciones.

Resultados

Donantes: 177; donación media/mujer: 5,883 litros; receptores: 307; Volumen LHD: 969, 16 litros; Volumen de leche pasteurizada: 811,333 litros. Indicaciones LHD fueron: EG < 32 semanas (49%); peso < 1500 gr (12,8%), cardiopatías congénitas (13%), Hipoxia/isquemia

Donación de leche humana como acto de generosidad de las mujeres
intestinal (13%), cirugía intestinal (5%), crecimiento intrauterino retardado (5%),
lactantes y principio de no discriminación positiva hacia los neonatos
más vulnerables.

Discusión

El BLD ha supuesto una mejora en la protección a la LM y su presencia ha potenciado la nutrición con LM de su propia madre. Un alto porcentaje de RNs vulnerables ha podido beneficiarse de la LHD, estableciéndose un criterio de discriminación positiva en función de la mayor vulnerabilidad de los pacientes como principio ético del mejor interés del RN. La donación voluntaria, altruista y anónima de las mujeres lactantes lo ha hecho posible

Conclusiones

El perfil de la mujer donante es similar a otros estudios, siendo el motivo principal ayudar a otros RNs

La principal indicación de LHD fue la prematuridad < 32 semanas, situación de gran vulnerabilidad.

Bibliografía.

1. Arnold LD. The ethics of donor human milk banking. Breastfeed Med. 2006; 1(1):3-13.
2. Halleux V. Use of donor milk in the neonatal intensive care unit. Semin Fetal Neonatal Med. 2017; 22(1):23-29.