

Negar el dolor fetal en la segunda mitad del embarazo puede socavar el derecho a la analgesia de los bebés prematuros.

## Negar el dolor fetal en la segunda mitad del embarazo puede socavar el derecho a la analgesia de los bebés prematuros.

No parece haber duda sobre los procesos de percepción del dolor en el desarrollo humano prenatal, de acuerdo con investigaciones como las del profesor de Pediatría Carlo V Bellieni, MD, en la Universidad de Siena, Italia y miembro del Comité de Bioética de la Presidencia de la Región de Toscana, Italia, y muchos otros, como investigadores de Sevilla, España: (<https://saib.es/investigadores-andaluces-aconsejan-el-uso-de-anestesia-en-fetos-a-partir-de-las-21-semanas-de-gestacion/>)

El profesor Bellieni llama la atención en una publicación en el blog Bioethics Today -del *The American Journal of Bioethics* (<https://bioethicstoday.org/about/>)-, sobre las controversias que sostienen algunos al señalar una excesiva edad tardía de percepción del dolor por el feto, y datar muy tarde el umbral del dolor, lo que podría suponer una praxis maleficente en actuaciones sobre fetos y sobre recién nacidos muy prematuros, al no analgesiarles debido a suponer que «no siente dolor».

Leer más: [denying-fetal-pain-in-the-second-half-of-pregnancy-can-undermine-preterm-babies-right-to-analgesia/#](#)